

ISSN-0755-66-24

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Avertissement destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège, rédigé en collaboration avec les G.D.A., les Coopératives et la Ferme de Loudes

N° 14 C du 29 MAI 1991

GRANDES CULTURES N° 5

CEREALES	:	Traitez	à l'épiaison
POIS PROTEAGINEUX	:	Traitez	les Pucerons
TOURNESOL	:	Attendez	un nouvel avis
MAIS	:	Traitez	selon la précocité le secteur

BLE

SEPTORIOSE

Due à *Septoria nodorum* observée entre Belpech et Salles/hers, mais à des niveaux très bas; aucune crainte compte-tenu du stade actuel du blé et des conditions climatiques.

ROUILLE BRUNE

Aucune évolution de cette maladie par rapport aux observations précédentes (notre bulletin N° 4 du 16/05/91)

OIDIUM

Il se maintient et a même tendance à évoluer; son impact sur le potentiel des cultures aux stades actuels est quasiment nul. Sa seule présence ne justifie pas d'une intervention spécifique. Les fongicides appliqués à l'épiaison limiteront son évolution, ainsi d'ailleurs que les fortes températures et le rayonnement solaire intense.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



TRAITEZ A LA PLEINE EPIAISON (notre conseil du 16/05/91) à l'aide d'une des solutions suivantes :

HORIZON	1	l/ha
LIBERO	1,5	l
ALTO AMBEL	0,5	l
ALTO	0,8	l
PLANETE R	1,5	l
SPOT	1,5	l

si forte pression d'Oïdium rajoutez

CORBEL	0,5	l/ha
BOSCOR	0,5	l

PUCERONS EPIS

Nous n'avons pas observé de cultures portant des pucerons sur les épis. Toutefois une observation de vos parcelles est indispensable avant toute décision de traitement.

Rappel seuil Pucerons : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puceron

Rajoutez au fongicide :	PIRIMOR G	0,250	kg/ha	TALSTAR	0,050	l/ha
	KARATE	0,125	l	BAYTHROID	0,300	l
	DECIS CE	0,125	l	FULL EW	0,300	l

La spécialité FULL étant compatible avec la spécialité HORIZON

NOTE IMPORTANTE : Ne traitez pas aux heures les plus chaudes de la journée quel que soit le produit, certaines variétés semblent réagir (nécroses sur le feuillage). La spécialité Horizon doit être appliquée le matin très tôt ou le soir très tard; en conditions chaudes et état hygrométrique faible il y a des risques de marquer la végétation.

POIS PROTEAGINEUX

Présence souvent importante de pucerons; si vos parcelles sont concernées utilisez une des solutions suivantes :

TALSTAR	0,075	l/ha	MAVRIK ou MAVRIK flo	0,210	l
BAYTHROID	0,250	l	KARATE	0,125	l
DECIS	0,250	l	PIRIMOR G	0,750	kg
SUMI ALPHA	0,400	l	SERK (pois multiplication)	1,5	l

TOURNESOL

Pas de projections significatives d'ascospores de phomopsis : aucun traitement n'est à envisager pour le moment

Vous serez informés de l'évolution du risque.

MAIS

SESAMIE : ce ravageur se manifeste en de nombreux sites depuis le 15 Mai. Si vos cultures de maïs semence sont précoces (2 à 3 F) :

TRAITEZ sauf : secteurs Avignonnet, vallée de la Vixiège et de l'Ilers
Un prochain avis fera le point pour ces secteurs
Pour ce 1^{er} traitement utilisez de préférence le **DIMILIN à 0,5 kg/ha**

Les Pyrèthréinoïdes sont ensuite presque exclusivement utilisés tout au long de la campagne, et leur impact sur la faune (entomofaune essentiellement) de la parcelle est plus important que celui du Diflubenzuron (Dimilin)